

ورسیگوات - اوژن

2.5 میلی گرم - 5 میلی گرم - 10 میلی گرم

قرص روکش دار

برگه راهنمای مصرف را نگهدارید زیرا ممکن است نیاز پیدا کنید دوباره آن را مطالعه کنید .

❖ برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تلفن‌های ۰۲۱-۸۸۰۲۰۵۷۹ و ۰۲۱-۴۰۸۸۲۶۷۵ تماس بگیرید و یا به وبسایت www.ozhanpharm.com مراجعه نمایید.

❖ آدرس پست الکترونیکی : info@ozhanpharm.com

دسته دارویی

قلبی-عروقی *گشادکننده عروق مورد استفاده در بیماری‌های قلبی* محرک گرانایلات سیکلاز محلول

اثر درمانی

ورسیگوات برای درمان بزرگسالان مبتلا به نارسایی قلبی طولانی مدت که اخیراً علائم نارسایی قلبی در آنها افزایش یافته است، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این دارو برای درمان نارسایی مزمن قلبی علامت دار در بیماران بزرگسال با کسر تخلیه کاهش یافته که پس از یک رویداد جریان ناپذیر اخیر که نیاز به درمان داخل وریدی داشته و وضعیتشان تثبیت شده است، تجویز می‌شود.

راهنمای‌های عمومی برای بیمار

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک معالج یا داروساز برسانید:

- 1- داشتن سابقه حساسیت
- 2- بارداری یا شیردهی
- 3- اگر فشار خون به هر دلیلی پایین است.

موارد منع مصرف

در شرایط زیر از مصرف ورسیگوات خودداری نمایید و با پزشک معالج یا داروساز مشورت نمایید:

- حساسیت به ورسیگوات
- اگر از داروهای دیگر محرک گوانیلات سیکلاز مانند ریوسیگوات استفاده می‌نمایید.
- این دارو در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مصرف نشود، زیرا هنوز در این گروه سنی مورد مطالعه قرار نگرفته است.
- اگر فشار خون سیستولیک شما کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر جیوه است.
- اگر اختلال شدید کبدی دارید.
- اگر اختلال شدید کلیوی دارید (eGFR کمتر از ۱۵ میلی لیتر در دقیقه در 1.73 متر مربع) یا دیالیز می‌شوید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

- بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است. قبل از شروع مصرف دارو، به پزشک متخصص اطلاع دهید.
- شیردهی: مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. در صورتی که در دوران شیردهی هستید یا قصد آن را دارید به پزشک متخصص اطلاع دهید.

هشدارها

قبل از مصرف داروی ورسیگوات با پزشک یا داروساز در موارد زیر مشورت نمایید.

- اگر علائم و موارد زیر را دارید تنظیم دوز یا قطع موقت مصرف ورسیگوات ممکن است در شرایط زیر ضروری باشد:
- فشار خون پایین همراه با علائمی مانند سرگیجه یا سبکی سر (فشار خون سیستولیک کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر جیوه).
- مشکلات شدید کلیوی یا تحت دیالیز بودن .
- مشکلات شدید کبدی.

احتیاطات

از مصرف همزمان این دارو با سایر داروها، بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.

- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.
- به محض اینکه در همان روز دوز فراموش شده را به یاد آوردید، قرص فراموش شده را مصرف کنید. به خاطر یک قرص فراموش شده، دوز مصرفی را دو برابر نکنید.
- احتمال افت فشار خون علامت دار باید در بیماران مبتلا به هیپوتانسی (کاهش حجم خون به دلیل مصرف دیورتیک ها، اسهال و استفراغ)، انسداد شدید خروجی بطن چپ، افت فشار خون در حالت استراحت، اختلال عملکرد سیستم عصبی خودکار، سابقه افت فشار خون یا درمان همزمان با داروهای ضد فشار خون (مانند دیورتیک ها ...) یا نیتترات های الی در نظر گرفته شود.

تداخلات دارویی

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک یا داروساز را مطلع سازید:

- مصرف هر دارویی که حاوی یک محرک گوانیلات سیکلاز محلول دیگر باشد، مانند ریوسیگوات به همراه ورسیگوات منع مصرف دارد.
- استفاده از مهارکننده‌های SPDE (مانند سیلنداقیل، تادالافیل، واردنافیل) هنگام مصرف ورسیگوات توصیه نمی‌شود.
- استفاده از نیتترات‌ها (مانند ایزوسورباید مونونیترات، نیتروگلیسرین) هنگام مصرف ورسیگوات توصیه نمی‌شود.
- ورسیگوات در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای مورد استفاده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، فشار خون سیستولیک را تقریباً ۱ تا ۲ میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهد.

❖ در موارد زیر تداخلی مشاهده نگردید ولی احتیاط توصیه می‌گردد:

- وارفارین
- تجویز دوزهای متعدد ورسیگوات (10 میلی گرم) یک بار در روز در افراد سالم، تأثیر یک دوز واحد وارفارین (25 میلی گرم) را بر زمان پروترومبین و فعالیت فاکتورهای VII و II و X تغییر نداد.
- ساکوبیتریل/السلارتان
- افزودن دوزهای متعدد ورسیگوات (2.5 میلی‌گرم) به دوزهای متعدد ساکوبیتریل/الزارتان (103/97 میلی‌گرم) در افراد سالم، در مقایسه با تجویز ساکوبیتریل/السلارتان به تنهایی، هیچ تأثیر اضافی بر فشار خون در حالت نشسته نداشته است.

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو

دوز مصرفی هر دارو توسط پزشک شما تعیین میشود، با این حال، مقدار معمول مصرف دارو به شرح زیر است:

بزرگسالان:

- قبل از شروع ورسیگوات، باید به بیمه سازی وضعیت حجم و درمان با دیورتیک برای تثبیت وضعیت بیماران پس از رویداد جریان ناپذیر (نارسایی قلبی) ، به ویژه در بیماران که سطح NT-proBNP بسیار بالایی دارند، توجه شود.
- دوز اولیه توصیه شده ۲.۵ میلی گرمی یک بار در روز است.

بسته به میزان تحمل درمان، دوز را پس از حدود ۲ هفته به ۱ قرص ۵ میلی‌گرمی یک بار در روز و پس از حدود ۲ هفته دیگر تا حداکثر دوز هدف ۱ قرص ۱۰ میلی‌گرمی یک بار در روز افزایش دهید.

- برای بیماران مسن نیازی به تنظیم دوز نیست.
- در بیمارانی که میزان فیلتراسیون گلومرولی تخمینی (eGFR) آنها کمتر از ۱۵ میلی لیتر در دقیقه در ۱.۷۳ متر مربع است و دیالیز نمیشوند ، نیازی به تنظیم دوز نیست. درمان با ورسیگوات در بیمارانی که eGFR آنها در شروع درمان بیشتر از ۱۵ میلی لیتر در دقیقه در ۱.۷۳ متر مربع است یا در حال دیالیز هستند ، توصیه نمی‌شود.
- در بیماران مبتلا به اختلال کبدی خفیف یا متوسط، تنظیم دوز لازم نیست. درمان با ورسیگوات در بیماران مبتلا به اختلال شدید کبدی توصیه نمی‌شود.
- اگر بیماران مشکلات تحمل پذیری (افت فشار خون علامت دار یا فشار خون سیستولیک (SBP) کمتر از 90 میلی‌متر جیوه را تجربه کنند، کاهش موقت دوز یا قطع ورسیگوات توصیه می‌شود.
- درمان نباید در بیماران با SBP کمتر از 100 میلی‌متر جیوه آغاز شود.
- هر روز یک قرص را همزمان با غذا مصرف کنید. اگر نمی‌توانید قرص را بلعید، می‌توانید ورسیگوات را خرد کرده و با آب مخلوط کنید. این مخلوط را فوراً مصرف کنید.

عوارض جانبی دارو

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اما این به معنی بروز آن‌ها در همه افراد نیست. در صورت مشاهده هر یک از عوارض زیر، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- بسیار شایع:
- افت فشار خون - افت فشار خون وضعیتی (سرگیجه، غش یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته).
- شایع:

- کم شدن گلبول‌های قرمز خون (کم خونی)، که می‌تواند باعث رنگ پریدگی پوست، ضعف یا تنگی نفس شود.
- سرگیجه
- سردرد
- افت فشار خون علامت دار

- سبکی
- حالت تهوع و استفراغ
- سوء هاضمه
- سوزش سر دل (بیماری رفلکس معده به مری)
- تعریق

- تاری دید
- خونی‌ریزی یا کبودی غیرمعمول

مصرف پیش از حد

در صورت مصرف اتفاقی، بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً با پزشک یا مرکز درمانی تماس گرفته و یا به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو

- دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی و دوزهای دارو

شرکت دانش بنیان داروفناوران اوژن داروی ورسیگوات را در قوطی‌های پلاستیکی، داخل جعبه مقوایی، به همراه برگه راهنمای دارو، بسته بندی و عرضه می‌نماید.

- قرص 2.5 میلی‌گرمی: 30 عدد در قوطی پلاستیکی
- قرص 5 میلی‌گرمی: 14 عدد در قوطی پلاستیکی
- قرص 10 میلی‌گرمی: 30 عدد در قوطی پلاستیکی
-

منابع :

1. [https://www.medicines.org.uk/emc\(Medicines Compendium\) \(abpi\)](https://www.medicines.org.uk/emc(Medicines Compendium) (abpi))
2. BNF-85-2023
3. Uptodate 2025

تاریخ آخرین بازنگری: 1404/11/25